

## Mogelijke bijwerkingen bij uw medicatie

De geneesmiddelen die u gebruikt bij uw behandeling (IUI, IVF, ICSI of ovulatie- inductie) worden hieronder in het kort beschreven. Het zal dan gaan om een korte uitleg over het doel van het medicijn, en wat de mogelijke bijwerkingen zijn van het medicijn.

De uitgebreide tekst is zowel op het internet als in de bijsluiter te lezen.

### Medicijnen ten behoeve van de stimulatie van de eierstokken

#### 1. Clomid/clomifeen citraat tabletten van 50 mg

- a. Doel: het laten groeien van 1 of meerdere eiblaasjes (follikels) in de eierstok.
- b. Mogelijke bijwerkingen:
  - Hoofdpijn
  - Buikpijn, misselijkheid, opgeblazen gevoel
  - Opvliegers
  - Emotioneel, vermoeidheid en neerslachtigheid

#### 2. Hormoon (Gonal F; Puregon, Menopur, Bemfola) injecties

- a. Doel: het laten groeien van 1 en/of (meestal) meerdere eiblaasjes/follikels
- b. Mogelijke bijwerkingen:
  - Hoofdpijn, misselijkheid
  - Opgeblazen gevoel
  - Zwaar gevoel in de onderbuik / trekkende pijn in de onderbuik
  - Gespannen borsten
  - In zeldzame gevallen allergische reactie op de injectieplaats

**NB: Het bewaken of vervolgen van uw behandeling met echo- en eventueel bloedonderzoek bij het gebruik van deze middelen, is bedoeld om de voornaamste complicatie van een ernstige ovariële stimulatie te voorkomen. Over OHSS leest u op onze site ([www.nijbarrahus.nl](http://www.nijbarrahus.nl)) bij het tabblad patiënten informatie/overstimulatie.**

### Medicijnen ten behoeve van het opwekken van de eisprong

#### 1. Pregnyl injectie (het medicijn gewonnen uit de urine van “moeders voor moeders”)

- a. Doel: het laten plaatsvinden van de rijping van de follikel(s) en eventueel de eisprong.
- b. Mogelijke bijwerkingen:
  - Zelden tot geen: alleen in combinatie met andere hormooninjecties de bijwerkingen als beschreven bij die hormooninjecties.
  - In zeldzame gevallen allergische reactie op de injectieplaats.

#### 2. Ovitrelle : als bij Pregnyl wat doel en bijwerking betreft.

## **Medicijnen ten behoeve van het tijdelijk remmen van de hypofyse**

- 1. Decapeptyl/Lucrin/ Orgalutran/ Cetrotide injecties; Synarel neusspray**
  - a. Doel: voortijdige follikel-, eicelrijping en eisprong tegen te gaan/ te voorkomen
  - b. Mogelijke bijwerkingen:
    - (bij langdurig gebruik, dat is langer dan 1 week): opvliegers
    - soms hoofdpijn en misselijkheid

## **Medicijnen ter ondersteuning van het baarmoederslijmvlies**

- 1. Utrogestan en Lutinus vaginaal tabletten**
  - a. Doel: te voorkomen dat het baarmoederslijmvlies te vroeg loslaat en er een menstruatie komt. Te vroeg is: periode tussen eisprong (inseminatie, punctie) en menstruatie van minder dan 10 dagen.
  - b. Mogelijke bijwerkingen:
    - Hoofdpijn
    - Vol, opgeblazen gevoel van de buik (lucht in de darmen)
    - Pijn in de borsten

**NB.**

**U kunt anders reageren op bovengenoemde medicatie: schroom niet ons te bellen en daarover vragen te stellen.**

- 1. Spanning over uw behandeling kunnen heel goed de oorzaak zijn van heel wat klachten (bespreek het met ons).**
- 2. Onze telefoonnummers: 0561-610030 /06-17436916 (spoednummer).**
- 3. Zie ook onze site bij het tabblad “patiënten informatie” onder “acute problemen”.**
- 4. Alle genoemde medicijnen hebben in uitgebreid onderzoek tot nu toe geen aanwijzingen gegeven voor:**
  - a. Een verhoogde kans op afwijkingen bij het kind.
  - b. Een verhoogde kans op kwaadaardige tumoren bij de aanstaande moeder.

**Tenslotte: veel succes bij uw behandeling!**

**Uw team van Nij Barrahûs.**